toggweiler
Medizinisches Labor
Mitglied des Medisupport Netzwerkes
Labor Toggweiler
Hertistrasse 1
8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 39 39
Fax +41 44 833 09 85
info@labortoggweiler.ch
www.labortoggweiler.ch

Mikrobiologie Gynäkologie

Bitte vollständig in Blockschrift ausfüllen!

Name: _____ Vorname: _____

Geburtsdatum: _____ EDV-Nr.: _____

Bei Kind, Name der erziehungsberechtigten Person: _____

Patienten-Etikett

Str.: _____ ☐ männlich ☐ weiblich

PLZ: _____ Wohnort: _____

☐ Dringend ☐ Vertraulich
☐ Telefon ☐ Fax
☐ Handy ☐ E-Mail
☐ Nr. / Adr.: .....

☐ Befundkommentar erwünscht

Dr med
Max Muster
Bahnhofstrasse 777
3172 Niederwangen
Tel: +41 31 777 77 77

Befund-Kopie:
☐ Patient
☐ Arzt / andere (Name, Vorname, Ort): .....

1-080110-4030

Entnahmedatum: _____
Zeit: _____

KVG-Typ:
☐ Schwangerschaft
☐ Krankheit
☐ Unfall

Rechnung automatisch an Krankenkasse
Vers.-Nr.: _____
Name KK: .....

Wenn anders gewünscht bitte ankreuzen:
☐ Auftraggeber ☐ zwingend Patient ☐ Andere: .....

Klinische Angaben / Fragestellung:

☐ SS ja Woche + Tage

30.10.2018, 11:06:53
MAMU
2002001

GENITALTRAKT

☐	Vaginalabstrich
☐	Vaginal- / Analabstrich
☐	Cervixabstrich
☐	Vulvaabstrich
☐	Urethralabstrich
☐	Ano-rektal-Abstrich
☐	Ulkus- / Bläschenabstrich Lokalisation: _____
☐	Penisabstrich
☐	Ejakulat 8
☐	Urin nach Prostatamassage (Urin-Vacutainer) 8
☐	Vorher gelöster Mittelstrahlurin (Urin-Vacutainer) 8
☐	Douglaspunktat
☐	Fruchtwasser / Plazenta
☐	Andere:

Allgemeine Bakteriologie	☐		☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐			☐
Multiplex-PCR Urogenitaltrakt 2	☐		☐		☐			☐	☐	☐		☐	☐	☐
Chlamydia trach. / Neisseria gono. PCR	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐
Genitale Ulcera Multiplex PCR 6	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐						☐
Streptokokken Gr.B in der Schwangerschaft	☐	☐	☐		☐	☐							☐	☐
Allgemeine Bakt. inkl. Anaerobier			☐				☐					☐	☐	☐
Aktinomyzeten Kultur			☐		☐							☐		☐
Chlamydia trachomatis PCR	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐
Gardnerella vaginalis Kultur	☐		☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐			☐
Hefen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐
Hämophilus ducreyi PCR							☐					☐		☐
Listerien Kultur													☐	☐
Mycoplasma hominis / Ureaplasmen Kultur	☐		☐		☐			☐	☐	☐	☐	☐		☐
Mycoplasma genitalium / M. hominis / Ureaplasma parvum / U. urealyticum PCR	☐		☐		☐			☐	☐	☐		☐		☐
Mycoplasma genitalium PCR	☐		☐		☐			☐	☐	☐		☐		☐
Neisseria gonorrhoeae PCR	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐
Neisseria gonorrhoeae Kultur	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐
Treponema pallidum PCR					☐		☐	☐				☐		☐
Toxoplasma gondii PCR													☐	☐
VIREN Cytomegalovirus PCR, qualitativ													☐	☐
VIREN Herpes-simplex-Virus 1 + 2 PCR	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐		☐
VIREN HPV inkl. Typisierung PCR		☐	☐	☐	☐	☐		☐						☐
VIREN Parvovirus B19 PCR													☐	☐

Klinische Angaben:

Antibiotika vor Entnahme:

Antibiotika nach Entnahme:

2 C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. hominis, M. genitalium, U. urealyticum, U. parvum, T. vaginalis
6 HSV-1, HSV-2, T. pallidum, H. ducreyi, Lymphogranuloma venereum (C. trachomatis Serotypen L1-L3), CMV, VZV
8 Bei Prostatitisabklärung einen Mittelstrahlurin (Vac.) vor- und einen 2. Urin (oder Ejakulat) nach Prostatamassage einzuschicken

DERMATOMYKOSEN

☐	Hautschuppen
☐	Nagel
☐	Haare
☐	Andere:

Lokalisation: _____

Dermatophyten, Schimmelpilze und Hefen	☐	☐	☐	☐
Nur Direktpräparat, Mikroskopie	☐	☐	☐	☐

Klinische Angaben:

☐ richtig ☒ falsch

HARNWEGE

		Mittelstrahlurin (Urin-Vacutainer)	Dauerkatheterurin (Urin-Vacutainer)	Einmalkatheterurin (Urin-Vacutainer)	Blasenpunktionsurin (Urin-Vacutainer)	Morgendlicher Erststrahlurin (nativ)	Früher Nachmittagsurin (nativ) (zwischen 11:00 - 15:00)	Mittelstrahlurin (nativ)	Mittelstrahlurin (Eintauchnährboden)	Dauerkatheter (Eintauchnährboden)	Einmalkatheter (Eintauchnährboden)	Andere:
Allgemeine Bakteriologie	1	☐	☐	☐					☐	☐	☐	☐
Multiplex-PCR Urogenitaltrakt	2					☐						☐
Chlamydia trach. / Neisseria gono. PCR						☐						☐
Mycoplasma hominis / Ureaplasmen Kultur					☐	☐						☐
Mycoplasma genitalium / M. hominis / Ureaplasma parvum / U. urealyticum PCR					☐	☐						☐
Hefen		☐	☐	☐	☐							☐
Allgemeine Bakteriologie inkl. Anaerobier					☐							☐
Chlamydia trachomatis PCR						☐						☐
Legionella pneumophila Antigen		☐				☐		☐				☐
Streptococcus pneumoniae Antigen		☐				☐		☐				☐
Neisseria gonorrhoeae PCR						☐						☐
Neisseria gonorrhoeae Kultur						☐						☐
M. tuberculosis-Komplex Kultur (mind. 100 ml) ☐1 ☐2 ☐3						☐						☐
Microsporidien PCR						☐						☐
Schistosomen (mind. 100 ml, Expressversand)							☐					☐
VIREN Adenovirus PCR	3					☐						☐
VIREN Cytomegalovirus PCR, qualitativ						☐		☐				☐
VIREN Enterovirus PCR	3					☐						☐

Klinische Angaben:

Krankheitsdauer:

Immunsuppression:

Antibiotika vor Entnahme:

Antibiotika nach Entnahme:

1 Von klinisch relevanten Erregern wird automatisch ein Antibiogramm erstellt
2 Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis
3 Nicht im akkreditierten Bereich

MULTIRESISTENTE BAKTERIEN, TRÄGERTUM

	Nasen- / Rachenabstrich, beidseits	Leistenabstrich, beidseits	Axillärer Abstrich, beidseits	Ano-rektal-Abstrich	Stuhl nativ (Deckel weiss)	Stuhl in Cary Blair (Deckel braun)	Mittelstrahlurin (nativ)	Mittelstrahlurin (Urin-Vacutainer)	Andere:
MRSA Kultur und Resistenz	☐	☐	☐					☐	☐
MRSA PCR	☐	☐	☐				☐		☐
ESBL, Kultur und Resistenz				☐	☐	☐		☐	☐
Multiresistente gramnegative Erreger (MRGN)				☐	☐	☐		☐	☐
VRE, Kultur und Resistenz				☐	☐	☐			☐

Klinische Angaben:

Für internen Gebrauch, bitte leer lassen!

Ausgepackt: _____ Interne Bemerkungen: _____

Etikettiert: _____ _____

☐ richtig ☒ falsch